


## Indications

- Dès que les glycémies sont stables et  $\leq 10$  mmol/L
- À la reprise d'une alimentation orale
- Relais à l'arrêt de la seringue électrique d'insuline

## Contre-indications

- Posologie d'insuline IVSE  $\leq 0,5$  UI/h (sauf DT1)
- Posologie d'insuline IVSE  $\geq 5$  UI/h
- Besoins en insuline non stabilisés

## Calcul de dose



On préférera l'utilisation d'une insuline lente dont la durée d'action est de 24 h.

PAS de délai entre l'arrêt de l'insuline IVSE et l'injection d'insuline lente SC.

L'injection sous-cutanée doit être IMMÉDIATE en préférant une injection à 20 h le soir.

Sinon faire une injection complémentaire selon le schéma suivant

Arrêt insuline IVSE	Entre 0 h et 6 h	Entre 6 h et 14 h	Entre 14 h et 16 h	Entre 16 h et 0 h
Dose d'insuline lente	$\frac{3}{4}$ dose	$\frac{1}{2}$ dose	$\frac{1}{4}$ dose	dose de 20 h
Dose d'insuline lente suivante	à 20 h le soir même			à 20 h le jour suivant

## PAS D'INSULINE IVSE EN SALLE D'HOSPITALISATION